Berita Biologi

Jurnal Ilmu-ilmu Hayati

BERITA BIOLOGI

Vol. 18 No. 2 Agustus 2019

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kemenristekdikti RI
No. 21/E/KPT/2018

Tim Redaksi (*Editorial Team*)

Andria Agusta (Pemimpin Redaksi, *Editor in Chief*)
(Kimia Bahan Alam, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Kusumadewi Sri Yulita (Redaksi Pelaksana, *Managing Editor*)
(Sistematika Molekuler Tumbuhan, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Gono Semiadi
(Mammalogi, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Atit Kanti
(Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Siti Sundari
(Ekologi Lingkungan, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Arif Nurkanto
(Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Kartika Dewi
(Taksonomi Nematoda, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Dwi Setyo Rini
(Biologi Molekuler Tumbuhan, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Desain dan Layout (*Design and Layout*)

Liana Astuti

Kesekretariatan (*Secretary*)

Nira Ariasari, Budiarjo

Alamat (*Address*)

Pusat Penelitian Biologi-LIPI
Kompleks Cibinong Science Center (CSC-LIPI)
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46,
Cibinong 16911, Bogor-Indonesia
Telepon (021) 8765066 - 8765067
Faksimili (021) 8765059
Email: berita.biologi@mail.lipi.go.id
jurnalberitabiologi@yahoo.co.id
jurnalberitabiologi@gmail.com

Keterangan foto cover depan: Stomata *Begonia* pada seksi *Platycentrum* dan *Bracteibegonia*
(*Notes of cover picture*): (*Stomata of Begonia sect. Platycentrum and Bracteibegonia*)
sesuai dengan halaman 181 (*as in page 181*).

Berita Biologi

Jurnal Ilmu-ilmu Hayati

P-ISSN 0126-1754

E-ISSN 2337-8751

Terakreditasi Peringkat 2

21/E/KPT/2018

Volume 18 Nomor 2, Agustus 2019

Berita Biologi	Vol. 18	No. 2	Hlm. 125 – 253	Bogor, Agustus 2019	ISSN 0126-1754
----------------	---------	-------	----------------	---------------------	----------------

Pusat Penelitian Biologi - LIPI

Ucapan terima kasih kepada
Mitra Bebestari nomor ini
18(2) – Agustus 2019

Dr. Renny Kurnia Hadiaty, Sc.D.
(Taksonomi Ikan, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo
(Ekologi Hutan dan Biogeografi Pulau, Ketua Forum Pohon Langka Indonesia)

Prof. Dr. Ir Subyakto M.Sc.
(Biokomposit, Pusat Penelitian Biomaterial - LIPI)

Prof. Dr. Andria Agusta
(Kimia Bahan Alam, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Dra. Djamhuriyah S. Said M.Si.
(Limnologi, Pusat Penelitian Limnologi - LIPI)

Dr. Ir. Daisy Wowor M.Sc.
(Krustasea/Karsinologi, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Dr. Wawan Sujarwo
(Etnobotani, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 'Eka Karya Bali' - LIPI)

Dr. Eng Desriani, M.Si.
(Bioteknologi Kesehatan, Pusat Penelitian Bioteknologi - LIPI)

Dr. Apon Zaenal Mustopa, M.Sc.
(Mikrobiologi dan Biologi Molekuler, Pusat Penelitian Bioteknologi - LIPI)

Dr. Himmah Rustiami, M.Sc.
(Taksonomi Tumbuhan, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Deden Girmansyah, M.Si.
(Taksonomi Tumbuhan (Begoniaceae), Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Dr. Yuyu Suryasari M.Sc.
(Pemuliaan dan Genetika Tumbuhan), Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Dr. Yuzammi
(Taksonomi Araceae dan Biologi Reproduksi Araceae, PKT Kebun Raya Bogor - LIPI)

Fahmi S.Pi., M.Phil.
(Ikhtiologi (Elasmobranchii), Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI)

Dr. Ir. Djumanto, M.Sc.
(Manajemen sumberdaya perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian - UGM)

Dr. Ir. Rudhy gustiano, M.Sc.
(Pemuliaan dan Genetika, Prof. Dr. Ir. Rudhy Gustiano, M.Sc.)

Dr. Heddy Julistiono
(Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Wara Asfiya M.Sc.
(Serangga/Entomologi, Pusat Penelitian Biologi - LIPI)

Dr. Nurainas
(Taksonomi Tumbuhan, Biologi, FMIPA - Universitas Andalas)

KERAGAMAN MORFOLOGI *Hoya purpureofusca* Hook.f. ASAL TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

[Morphological Variation of *Hoya purpureofusca* Hook.f. from Gunung Gede Pangrango National Park]

Sri Rahayu✉*, Kartika Ning Tyas dan Hary Wawangningrum

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI, Bogor
Jl. Ir. H. Juanda no 13 Bogor 16122
email: srirahayukrb@yahoo.com

ABSTRACT

Hoya purpureofusca Hook.f. (Apocynaceae: Asclepiadoideae) has been used as an ornamental plant and the international trade of this species has become increasing. This species has restricted distribution on the high elevation of Java and Bali mountains. This epiphyte climber has succulent leaves and umbellate delicate flowers. Flower has star shape, succulent and waxy, purple., c.1 cm in diameter. The observation on the morphological characteristic is aimed to select the best sample for ornamental plant. The total of 17 observed samples were obtained from three populations at Gunung Gede Pangrango National Park, West Java, Indonesia. The selection was based on the node length, size of the leaves, and flower number, size and color. The result showed that P01 from Cibodas could be developed as leaf ornamental plant, because its shortest node and small leaves. SP1 from Selabintana could be developed as flower ornamental plant, it has numerous, larger and deep purple flower. SP1 and P01 have the farthest relatives distance among all observed accessions, but still have a similarity of 75%.

Keywords: *Hoya purpureofusca*, morphological characters, ornamental plant, selection.

ABSTRAK

Hoya purpureofusca Hook.f. (Apocynaceae: Asclepiadoideae) telah dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan permintaan terhadap jenis ini di perdagangan internasional meningkat. Jenis ini hanya terdapat di pegunungan Jawa dan Bali. Tumbuhan epifit memanjat ini mempunyai daun sukulen dan rangkaian bunga yang berbentuk payung. Bunganya berbentuk seperti bintang, sukulen dan berlilin, berwarna ungu, dengan diameter sekitar 1 cm. Pengamatan karakter morfologi pada penelitian ini bertujuan untuk menyeleksi karakter dari sampel yang dapat dikembangkan sebagai tanaman hias. Total 17 sampel tanaman diperoleh dari 3 populasi di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat, Indonesia. Seleksi dilakukan berdasarkan panjang ruas, ukuran daun, dan pada bunga adalah jumlah, ukuran dan warnanya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aksesori terpilih untuk tanaman hias daun adalah P01 dari Cibodas yang memiliki ruas terpendek dan daun kecil. Aksesori terpilih untuk tanaman hias bunga adalah SP1 dari Selabintana yang memiliki perbungaan yang besar, berwarna ungu tua dengan jumlah bunga yang banyak. SP1 dan P01 memiliki jarak kekerabatan paling jauh diantara semua aksesori yang diamati, tetapi masih memiliki tingkat kesamaan 75%.

Kata kunci: *Hoya purpureofusca*, karakter morfologi, seleksi, tanaman hias.

PENDAHULUAN

Hoya purpureofusca Hook.f. (Apocynaceae: Asclepiadoideae) adalah salah satu jenis *Hoya* yang persebarannya terbatas di dataran tinggi Pulau Jawa dan Bali (Rahayu, 2012a) Jenis ini sebelumnya disebut dalam Sunaryo dan Rugayah (1992) dengan nama *H. cinnamomifolia* Hook. *H. purpureofusca* merupakan salah satu jenis tumbuhan dataran tinggi Pulau Jawa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman hias dan memiliki nilai konservasi karena persebaran sempit dan populasi jarang (Rahayu, 2012b). Potensi pengembangan sebagai tanaman hias tidak terlepas dari karakteristik bunga yang indah serta daun yang menarik. Perdagangan secara internasional sebagai tanaman hias dilakukan terutama diantara para penggemar *Hoya* di seluruh dunia. Penggemar *Hoya* pada saat ini banyak

terdapat di Eropa dan Amerika Serikat. Awal pemanfaatan *H. purpureofusca* sebagai tanaman hias di perkirakan pada sekitar abad 18, dan merupakan koleksi perusahaan tanaman hias Mr. Veitch di Inggris. Gambar lukisan dan deskripsi tanaman ini muncul pertama kali di Botanical Magazine tahun 1850 (Fitch, 1850). Namun demikian, tanaman ini masih belum umum dibudidayakan sebagai tanaman hias di Indonesia dan masih hidup liar di habitat aslinya di pegunungan dataran tinggi Pulau Jawa dan Bali. Nama daerah di Bali disebut dengan tebel-tebel, sedangkan di Tengger disebut suruh bekathak. Pemanfaatan oleh penduduk lokal sebatas sebagai pelengkap sesajen pada upacara khusus di Bali dan sebagai anti tenung di suku Tengger (Rahayu, pers com with the local people). Data etnobotani di Jawa Barat tidak ada. Sebagai epifit yang persebarannya

*Kontributor Utama

*Diterima: 17 Januari 2018 - Diperbaiki: 8 Oktober 2018 - Disetujui: 24 Juli 2019

terbatas di pegunungan dataran tinggi Pulau Jawa dan Bali, keberadaan tumbuhan ini termasuk langka (Sunaryo dan Rugayah, 1992).

H. purpureofusca Hook.f. merupakan epifit merambat, daun bersilang berhadapan, menjantung, tebal dan kaku, seukuran telapak tangan. Perbungaan dalam tandan payung dengan ukuran pedicel/tangkai bunga seragam. Mahkota (korona) dan mahkota tambahan (korola) berjumlah lima, berbentuk seperti bintang, mengkilap berlapis lilin tebal, berwarna ungu, dengan diameter kuntum mekar *ca.* 1 cm. Buah berupa buah bumbung, panjang hingga 20 cm, dan diameter mencapai 5 mm.

Sebagai tumbuhan yang masih tumbuh liar di habitatnya, pada umumnya dijumpai keragaman genetik di dalam populasi yang akan berbeda strukturnya jika terjadi perubahan habitat (Aguilar *et al.*, 2008). Adanya keragaman genetik yang diekspresikan melalui keragaman morfologi setelah berinteraksi dengan lingkungan tempat tumbuhnya merupakan bahan awal dalam seleksi untuk memilih aksesori yang paling baik sebagai tanaman hias. Hasil seleksi dapat diarahkan menjadi varietas baru yang dapat diintroduksi sebagai tanaman hias terbudidaya. Keberadaan populasi *H. purpureofusca* di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diketahui berdasarkan studi lapangan ke berbagai resort di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, karena persebaran *Hoya* dapat melampaui berbagai lokasi dengan persebaran biji yang di bantu angin, seperti pada *H. multiflora* Blume (Rahayu *et al.* 2012a). Studi sebelumnya diketahui bahwa terdapat populasi *H. purpureofusca* di Resort Cibodas, Selabintana dan Situ Gunung. Ketiganya merupakan daerah dataran tinggi di atas 900 m dpl (Hidayat *et al.*, 2012)

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis keragaman morfologi *H. purpureofusca* yang berasal dari tiga populasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu populasi Cibodas, populasi Selabintana dan populasi Situ Gunung. Hasil analisis akan digunakan untuk menentukan aksesori terpilih yang akan digunakan sebagai kandidat tanaman hias yang akan dikembangkan dikemudian hari di Kebun Raya Bogor.

BAHAN DAN CARA KERJA

Penelitian dilakukan di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Eksplorasi untuk mengkoleksi *H. purpureofusca* Hook.f. dilakukan di tiga lokasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu dari Cibodas, Selabintana dan Situ Gunung.

Pengamatan terhadap sampel dilakukan secara observatif terhadap seluruh sampel *H. purpureofusca* Hook.f. yang diperoleh selama eksplorasi. Keragaman sifat morfologi terutama yang konsisten dan berbeda antar individu diamati. Karakter yang diamati meliputi karakter vegetatif dan karakter generatif, baik yang berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Pengamatan karakter vegetatif untuk data kuantitatif meliputi panjang dan diameter ruas batang; panjang dan diameter petiole/tangkai daun; panjang dan lebar daun; tebal daun; dan luas daun. Data kualitatif berupa warna daun, bentuk daun; bentuk pangkal dan ujung daun. Karakter generatif untuk data kuantitatif berupa panjang pedunkel/ tangkai rangkaian bunga/tangkai payung, panjang pedisel/tangkai bunga/tangkai kuntum, ukuran korona/mahkota dan korola/mahkota tambahan. Karakter generatif untuk data kualitatif yang diamati adalah warna-warna kuncup, warna mahkota mekar dan warna korona. Pengamatan warna menggunakan *Color Chart standar* (RHS color chart). Seleksi karakter morfologi (vegetatif) dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan untuk mengetahui hubungan antar aksesori dilakukan analisis diskriminan dan klastering.

HASIL

Karakter vegetatif

Sebanyak 17 aksesori berhasil diperoleh dari tiga populasi, yaitu populasi Selabintana (3 aksesori), populasi Situgunung (3 aksesori) dan populasi Cibodas (11 aksesori) dan pengamatan terhadap karakter vegetatif meliputi ukuran ruas pada batang, ukuran daun dan warna daun telah dilakukan (Tabel 1). Seleksi dilakukan terhadap ukuran ruas pendek dan ukuran daun yang sempit atau kecil. Berdasarkan seleksi, jika mengikuti panjang ruas terpendek dimiliki oleh aksesori dari Cibodas (P01) dengan rerata 5,5 cm. Namun, jika digabungkan dengan karakter luas daun, aksesori ini memiliki ukuran daun relatif

Tabel 1. Karakter morfologi daun *H. purpureofusca* dari Cibodas, Selabintana dan Situ Gunung. (*Morphological characters of H. purpureofusca leaves from Cibodas, Selabintana and Situ Gunung*).

Asal (Source/ Loca- tion)	No aksesi (Accession no.)	Panjang Ruas (Internode length) (cm)	Diameter Ruas (internode diameter) (mm)	Panjang tangkai daun (Petiole length) (mm)	Dia- me- ter tangkai daun (Petiole length) (mm)	Panjang helai daun (Lamina length) (cm)	Lebar helai daun (Lamina width) (cm)	Tebal pangkal helai daun (Lamina base thick- ness) (mm)	Tebal tengah helai daun (Middle lamina thickness) (mm)	Tebal ujung helai daun (Lamina apex thickness) (mm)	Luas Daun (Leaf area) (cm ²)	Warna Daun (Lamina color) (RHS col- our Chart)
Situ- Gunung	GPI	8,0±3,0	2,71±1,0	3,5±0,6	7,72±1,1	19,5±2,6	9,0±0,9	1,62±0,3	1,60±0,3	1,59±0,3	111,1±26,2	Hijau-146A
	GP2	12,0±2,2	4,59±0,8	2,2±0,6	4,71±1,0	17,7±2,9	5,0±1,3	1,35±0,2	1,41±0,1	1,33±0,2	88,9±25,2	Merah-48A
	GP3	6,0±4,1	4,24±0,4	2,2±1,1	5,08±0,6	20,8±2,4	7,6±1,0	0,80±0,2	0,71±0,2	0,90±0,2	111,1±21,7	Hijau-146A
Cibodas	P01	5,5±3,3	4,49±0,5	2,5±1,0	4,68±0,9	17,4±2,6	7,1±1,1	2,47±0,7	1,90±0,5	1,14±0,5	66,7±21,6	Hijau-146A
	P02	6,0±1,1	2,81±0,9	4,0±1,3	4,86±1,4	16,0±5,5	5,6±1,9	1,70±0,5	0,85±0,3	0,78±0,3	66,7±29,3	Hijau-146A
	P03	9,5±3,7	5,10±0,8	2,7±0,9	4,01±1,1	13,5±3,7	5,5±1,4	1,09±0,3	0,77±0,3	0,65±0,3	44,4±32,8	Hijau-146A
	P04	24,7±5,0	2,85±0,3	2,5±0,3	4,57±0,5	12,5±2,8	5,0±1,4	1,28±0,4	0,92±0,4	0,85±0,5	44,4±28,3	Hijau-146A
	P06	14,0±2,9	2,96±0,3	2,6±1,0	4,50±1,2	14,0±1,3	5,3±1,3	0,81±0,5	1,16±0,1	2,28±0,6	66,7±19,3	Hijau-146A
	P10	10,0±5,1	3,67±0,5	4,5±0,6	5,70±0,6	29,0±3,1	6,5±0,8	1,45±0,3	1,08±0,2	0,70±0,2	133,3±24,7	Hijau-146A
	P11	33,2±7,6	4,03±0,5	4,4±0,8	5,30±0,7	15,3±1,7	6,9±1,0	2,21±0,4	1,81±0,3	1,69±0,3	77,8±17,2	Hijau-146A
Selabin Tana	P13	9,3±5,5	3,45±0,4	2,4±0,4	4,71±0,3	16,6±1,9	7,0±0,7	1,08±0,3	1,04±0,3	1,12±0,3	77,8±12,8	Hijau-146A
	SP1	13,0±7,0	3,16±0,5	4,0±0,5	5,54±0,8	23,0±4,0	8,0±1,9	0,99±0,1	0,98±0,1	0,79±0,2	122,2±40,2	Hijau 147B
	SP2	19,0±3,2	3,33±0,6	4,0±0,1	6,66±0,4	22,0±0,7	8,0±0,2	1,29±0,2	0,81±0,2	0,78±0,2	111,1±7,9	Hijau 147B
	SP3	11,0±3,4	3,40±0,6	2,0±0,6	5,49±0,8	16,5±4,2	5,0±1,1	1,53±0,3	1,03±0,3	1,02±0,1	44,4±36,0	Hijau 147B

Keterangan: Data merupakan rerata dari daun pada tiap akses

Notes : data are the average of measurements of the leaves from each accession.

kecil, meski bukan daun yang terkecil. Ukuran daun terkecil dimiliki aksesori dari Cibodas yang lainnya (P04) dan Selabintana (S03). Namun demikian, prioritas utama untuk seleksi didasarkan pada ukuran panjang ruas, yaitu ruas yang terpendek jika dibandingkan dengan ukuran daun. Hal ini karena sebagai kandidat tanaman hias, panjang ruas menentukan panjang batang keseluruhan dan jumlah daun. Setiap perbukuan *Hoya* terdapat sepasang daun yang merupakan ukuran pertumbuhan. Bagi *Hoya*, daun adalah sebagai pusat metabolisme yang menghasilkan energi bagi tumbuhan itu sendiri. Sebagai epifit merambat, *H. purpureofusca* akan tampak lebih kompak jika memiliki ukuran ruas yang pendek, karena akan memiliki jumlah daun lebih banyak pada ukuran batang yang sama.

Bentuk daun *Hoya* jenis ini pada umumnya ovate atau memanjang dengan pangkal membundar dan ujung runcing. Bentuk ini lebih didasarkan pada proporsi antara panjang dan lebar daun. Sebagai tanaman hias bunga, maka ukuran daun yang kecil atau sempit lebih disukai karena untuk mengimbangi ukuran bunga yang relatif kecil, sehingga terbentuk komposisi yang seimbang. Jika *Hoya* ditujukan untuk tanaman hias daun, maka ukuran daun yang besar serta tebal akan menjadi daya tarik tersendiri.

Perbedaan variasi morfologi karakter vegetatif *H. purpureofusca* merupakan hal yang wajar, karena di setiap populasi tumbuhan, variasi morfologi dapat diartikan sebagai ekspresi dari variasi genetik yang terdapat di dalam populasi. Variasi karakter vegetatif maupun karakter generatif juga terdapat pada

populasi *H. multiflora* Blume yang terdapat di Gunung Gede Pangrango, terutama di wilayah Bodogol (Rahayu *et al.*, 2010b).

Karakter generatif

Aksesori yang berhasil dikoleksi dari TNGGP tidak semuanya dijumpai dalam keadaan berbunga. Proses pembungaan *Hoya* di pengaruhi banyak faktor, namun jenis yang berbeda akan memiliki faktor pendorong yang berbeda. Sebagai misal, *H. diversifolia* yang tumbuh spontan di Kebun Raya Bogor proses pembungaannya di inisiasi perubahan musim hujan ke musim kemarau (Rahayu, 1998). Namun demikian untuk *H. purpureofusca* belum di ketahui faktor-faktor pendorong dalam pembungaannya. Empat aksesori yang berbunga, yaitu satu dari Cibodas (P01), satu dari Selabintana (SP1), dan dua dari Situgunung (GP1 dan GP2). Terbatasnya jumlah aksesori yang berbunga menyebabkan analisis tidak dilakukan untuk karakter generatif.

Berdasarkan hasil pengamatan dari bunga *H. purpureofusca* yang berhasil dikoleksi dapat diketahui bahwa dalam setiap rangkaian bunga terdapat 15–38 bunga. Panjang pedunkel 6,5–12,5 cm, sedangkan panjang pedicel 2,9–3,3 cm. Diameter korola 1,5–1,6 cm dan diameter korona 0,8–0,9 cm. Warna korola ada pada gradasi warna ungu (Purple 61A, Purple 64A dan Purple 75A), sedangkan warna korona ada pada warna ungu yang sama, yaitu Purple 64A (Tabel 2).

Berbeda dengan karakter vegetatif, seleksi

Tabel 2. Karakter generatif pada bunga *Hoya purpureofusca* asal Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. (*Generative characters of Hoya purpureofusca of Gunung Gede Pangrango National Parks*)

No. Aksesori (Accession No.)	Panjang Gagang perbungaan (Peduncle length) (cm)	Panjang gagang bunga (Pedicel length) (cm)	Jumlah bunga (Number of flower)	Diameter mahkota (Corolla diameter) (cm)	Diameter mahkota tambahan (Corona diameter) (cm)	Warna mahkota* (Corolla color*)	Warna mahkota tambahan* (Corona color*)
GP1	10,1	3,0	15,5	1,5	0,8	Purple 64A	Purple 64A
GP2	8,2	2,9	17,5	1,5	0,8	Purple 64A	Purple 64A
P01	6,5	3,0	18	1,5	0,8	Purple 61A	Purple 64A
SP1	12,5	3,3	38	1,6	0,9	Purple 75A	Purple 64A

Keterangan : Semua karakter diukur dari satu bunga yang ditemukan saat eksplorasi. *diukur menggunakan Royal Horticulture Society (RHS) Colour Chart Notes: All characters are measured from one flower found during exploration. * measured by using Royal Horticulture Society Color Chart

Tempat tumbuh (Habitat)	Morfologi (Morphology)
1. Cibodas, 1400m dpl, hutan campuran, lereng dan lembah/datar dekat sungai. Phon dominan <i>Altingia excelsa</i> , <i>Castanopsis javanica</i> dan <i>Lithocarpus indutus</i> . (Cibodas, 1400m asl, mixed forest, on slope and valley/flat place near the river. The dominant trees are <i>Altingia excelsa</i> , <i>Castanopsis javanica</i> dan <i>Lithocarpus indutus</i>).	Bunga ungu muda. Daun ovate. Panjang ruas batang 3-33,2 cm. (Light purple flower. Ovate leaves. The length of the stem segment is 3-33.2 cm).

2. Selabintana, 1200 m dpl, lembah dekat sungai. Pohon dominan Puspa (<i>Schima wallichii</i>). (Selabintana, 1200 m asl, valley near the river. The dominant tree is Puspa (<i>Schima wallichii</i>).	Bunga ungu dengan pinggir hijau. Daun ovate, lebih sempit dan panjang. Panjang ruas batang 4-29 cm. (Purple flower with green edges. Ovate leaves, narrower and longer. The length of the stem segment is 4-29 cm).

3. Situgunung, 1000 m dpl, lembah dekat danau, tempat terbuka. Tegakan <i>Syzygium</i> dan <i>Schima wallichii</i> . (Situgunung, 1000 m asl, valley near the lake, open area. The dominant trees are <i>Syzygium</i> and <i>Schima wallichii</i> .)	Bunga ungu. Daun ovate, lebih lebar. Panjang ruas batang 6-22 cm. (Purple flower. Ovate leaves, wider. The length of the stem segment is 6-22 cm).

Gambar 1. Perbedaan morfologi bunga dan daun *Hoya purpureo-fusca* asal Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) (Morphological differences in flowers and leaves of *Hoya purpureo-fusca* from Gunung Gede Pangrango National Park).

berdasarkan karakter generatif di arahkan untuk ukuran yang lebih besar, terutama ukuran dan jumlah bunga, termasuk ukuran panjang pedunkel dan panjang pedicel. Besarnya jumlah dan ukuran organ bunga akan menunjang penampilan yang lebih menyolok dan menarik. Berdasarkan pengamatan, ukuran panjang pedunkel, panjang pedicel, jumlah bunga, ukuran mahkota dan korona, aksesi dari Selabintana memiliki keunggulan dibandingkan dari Cibodas dan Situgunung. Hal ini ditambah dengan

warna ungu aksesi dari Selabintana memiliki warna lebih tua, sehingga lebih menarik (Tabel 2). Selain itu, pada bagian ujung mahkota memiliki gradasi warna kehijauan. Hal ini menimbulkan corak tersendiri yang menjadi daya tarik.

Berdasarkan hasil pengamatan generatif dan vegetatif, maka aksesi SP1 dari Selabintana memiliki panjang ruas relatif sedang (13 cm), lebih panjang dari ukuran terpendek, yaitu 5,5 cm (P01) yang dimiliki aksesi dari Cibodas. Namun jauh lebih

pendek dari ruas terpanjang yaitu 33,2 cm yang dimiliki aksesori dari Cibodas juga (P11). Oleh karena itu, maka aksesori SP1 dari Selabintana merupakan aksesori yang layak dikembangkan sebagai kandidat unggulan untuk tanaman hias. Kedepannya, jika menginginkan varietas dengan ukuran ruas yang lebih pendek, maka aksesori SP1 dapat dikawin-silangkan dengan aksesori P01 dari Cibodas. Persilangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan aksesori dengan ruas pendek, namun memiliki bunga yang besar dan menarik.

Hubungan kekerabatan antar aksesori

Meskipun berdasarkan pengamatan telah dipilih aksesori kandidat yang akan dikembangkan sebagai tanaman hias, namun dalam proses domestikasi dan pemuliaan terkadang diperlukan perakitan genetik melalui perkawinan silang. Keberhasilan suatu persilangan seringkali dapat ditentukan dari kedekatan jarak genetik antar aksesori. Oleh karena itu, kedekatan antar aksesori dilakukan berdasarkan karakter morfologi menggunakan analisis diskriminan dan klastering.

Berdasarkan analisis diskriminan, terdapat dua fungsi utama yang menyumbang keragaman, yaitu karakter diameter petiole, menyumbang keragaman sebesar 64%, sedangkan sisanya yang merupakan fungsi kedua sebesar 46% disumbangkan oleh karakter luas daun. Grup 1 merupakan anggota dari aksesori yang berasal dari Situ Gunung, Grup 2 dari Selabintana dan Grup 3 dari Cibodas (Gambar 1). Beberapa anggota dari Grup 1 maupun Grup 2 bercampur dengan anggota Grup 3, menunjukkan kedekatan. Hasil analisis klastering yang dinyatakan dengan dendrogram menunjukkan hal yang sama. Anggota pada Grup 1 cenderung lebih mengumpul jika dibandingkan dengan Grup 2 dan Grup 3. Hal ini menunjukkan bahwa karakter morfologi pada Grup 1 lebih homogen (Gambar 2).

Berdasarkan analisis klastering yang digambarkan melalui dendrogram (Gambar 2), masing-masing aksesori tidak memisah berdasarkan asal lokasinya melainkan bergabung dengan aksesori dari lokasi lainnya dalam grup. Seluruh aksesori memiliki tingkat ketidaksamaan 25%, atau dengan

Gambar 2. Pengelompokan diskriminan aksesori *Hoya purpureofusca* asal Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan karakter morfologi batang dan daun. (Clustering of the three *Hoya purpureofusca* populations from Gunung Gede National Park based on vegetative traits)

Gambar 3. Dendrogram ketidakmiripan antar akses *Hoya purpureofusca* di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan karakter morfologi batang dan daun. (*Dendrogram of dissimilarity between Hoya purpureofusca accessions from Gunung Gede Pangrango National Parks based on vegetative characters*).

kata lain memiliki tingkat kesamaan 75%. Akses memisah menjadi dua grup pada ketidaksetaraan 25%, yaitu grup satu dengan lima anggota (P10, SP1, SP2, GP1 dan GP3). Akses lainnya bergabung menjadi grup kedua. Akses SP1 yang diharapkan satu grup dengan P01 karena memiliki prospek untuk dikawinsilangkan sebagai kandidat terseleksi, ternyata terpisah dengan jarak 25% pada hasil analisis ini. Namun demikian, karena masih memiliki tingkat kesamaan sebesar 75%, maka masih dianggap cukup dekat.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi karakter

Karakter morfologi yang diamati adalah merupakan ekspresi dari faktor genetik dan lingkungan. Karakter generatif umumnya berupa data kualitatif terutama bentuk yang relatif lebih stabil dari pengaruh lingkungan. Namun demikian, warna bunga kadangkala juga dipengaruhi oleh tingkat keasaman (pH) media tumbuh, akan tetapi karakter pola warna merupakan karakter stabil.

Ukuran dapat merupakan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Karakter-karakter tertentu yang memiliki gen polimorfik dapat memiliki keuntungan untuk memilih mengekspresikan alel tertentu yang sesuai dengan lingkungannya untuk daya adaptasinya. Jika alel tersebut terekspresikan terus menerus dalam proses evolusinya dapat menjadi alel tetap, sedangkan alel yang tidak pernah terekspresikan dapat mengalami delesi. Keragaman morfologi bunga sangat ditentukan oleh keragaman genetiknya (Stout *et al.*, 2015).

Berdasarkan hasil pengamatan morfologi karakter vegetatif, terutama daun dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan morfologi pada bentuk, ketebalan, luas dan warna daun *H. purpureofusca*. *Hoya* yang ditemukan di tempat ternaung daunnya berwarna hijau, relatif lebih tipis dan lebih lebar, sedang yang di tempat terbuka (GP1 dan GP2) mempunyai daun yang relatif lebih sempit, tebal dan daun yang berwarna oranye berbintik merah.

Luas, tebal dan warna daun merupakan cerminan adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang diterima tanaman

mempengaruhi bentuk dan anatomi daun termasuk sel epidermis dan tipe sel mesofil (Mohr, 1995). Perubahan tersebut merupakan mekanisme untuk pengendalian kualitas dan jumlah cahaya yang dapat dimanfaatkan oleh kloroplas daun dalam fotosintesis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa daun *Hoya* yang tumbuh di tempat yang ternaungi lebih tipis dan lebar dibandingkan dengan daun tanaman di tempat terbuka. Penambahan luas daun diperlukan tanaman di tempat ternaung untuk menambah bidang penangkapan cahaya, sedangkan ketebalan daun berkurang disebabkan pengurangan lapisan palisade dan sel-sel mesofil. Lapisan palisade dapat berubah sesuai kondisi cahaya yang diterima oleh daun yang menyebabkan tanaman menjadi efisien dalam menyimpan energi cahaya untuk perkembangannya (Taiz dan Zeiger, 2002). Kemampuan tanaman memanen energi matahari untuk mengubah CO₂ udara menjadi molekul organik yang lebih kompleks (proses fotosintesis) merupakan karakter yang paling penting pada tanaman. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis pada tanaman antara lain adalah ketersediaan CO₂, H₂O, cahaya, hara, suhu, umur dan genetika tumbuhan (Salisbury dan Ross, 1992).

Levitt (1980) dan Ruberti *et al.* (2012) juga menyatakan bahwa tanaman dapat beradaptasi terhadap intensitas cahaya rendah melalui mekanisme penghindaran dan toleransi. Gommers *et al.* (2013) menyatakan bahwa adaptasi sifat toleran terhadap naungan merupakan pilihan jika tanaman tidak dapat tumbuh tinggi atau di puncak kanopi. Beberapa jenis *Hoya* memiliki karakteristik habitat berbeda berdasarkan zonasi tumbuhnya (Rahayu dan Abdulhadi 2013). Jenis jenis *Hoya* yang toleran terhadap naungan akan lebih banyak tumbuh pada zona batang pohon dan awal percabangan, sedangkan jenis jenis *Hoya* yang toleran terhadap cahaya akan tumbuh pada daerah tajuk pohon. Mekanisme penghindaran kekurangan cahaya dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penangkapan cahaya melalui perluasan daun dan dengan menurunkan kandungan pigmen non kloroplas (Carabeli *et al.*, 2012). Hal ini menyebabkan daun yang tumbuh di tempat dengan intensitas cahaya rendah cenderung berwarna hijau

atau gelap. Namun demikian warna hijau daun di tempat ternaung biasanya diikuti warna agak kebiru-biruan yang berasal dari *iridescence* dan merupakan sel yang sangat efisien dalam penggunaan cahaya (Jacobs *et al.*, 2016). Daun *Hoya* yang tumbuh pada tempat terbuka berwarna oranye diduga merupakan upaya daun untuk melindungi pigmen fotosintesis, yaitu klorofil, dari kerusakan akibat intensitas cahaya tinggi dengan meningkatkan pembentukan karotenoid (karoten dan xanthofil), yang mempunyai warna campuran kuning dan jingga (Sandmann dan Scheer, 1998). Bintik-bintik merah pada daun *Hoya* yang tumbuh di tempat terbuka menunjukkan pada daun terjadi pembentukan antosianin, yang berfungsi untuk menyerap sinar UV (Artlip dan Wisniewski, 2001).

KESIMPULAN

Hoya purpureofusca di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai perbedaan morfologi pada bentuk, ketebalan, luas dan warna daun. Perbedaan karakter tersebut merupakan hasil adaptasi *Hoya* pada habitatnya untuk efisiensi penangkapan cahaya. Berdasarkan seleksi karakter vegetatif yang memilih ukuran minimal, maka aksesori P01 dari Cibodas merupakan kandidat untuk dikembangkan sebagai tanaman hias daun, sedangkan berdasarkan karakter generatif yang memilih ukuran maksimal, aksesori SP1 dari Selabintana merupakan kandidat untuk dikembangkan sebagai tanaman hias berbunga. Jika harus memilih salah satu, SP1 lebih diutamakan, dan jika menginginkan karakter minimal vegetatifnya dapat dikawinsilangkan dengan P01. Namun demikian, SP1 dan P01 memiliki jarak kekerabatan paling jauh diantara semua aksesori, tetapi masih memiliki tingkat kesamaan 75%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan pendanaan dari Program PKPP Tahun 2011 dan di lanjutkan dengan Program *In House Reserach* PKT Kebun Raya-LIPI, dengan melakukan pengamatan di rumah kaca *Hoya* PKT Kebun Raya-LIPI. Untuk

itu, kami mengucapkan rasa terimakasih kepada Kemenristek dan Kementerian Pendidikan Nasional serta LIPI yang telah menyelenggarakan Program PKPP. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pimpinan PKT Kebun Raya-LIPI atas sarana dan ijin yang diberikan, Kepada Kepala Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan para Kepala Resort, Rekan Tim PKPP Hoya, Pembantu Lapangan di Resort Cibodas, Selabintana dan Situgunung, serta Bapak Fredy Pattiruhu yang membantu dalam pemeliharaan tanaman di Rumah Kaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, R., Quesada, M., Ashworth, L., Herrerasdiego, Y. and Lobo, J., 2008. Genetic consequences of habitat fragmentation in plant populations: Susceptible signals in plant traits and methodological approaches. *Molecular Ecology*, 17, pp. 5177–5188.
- Artlip, T.S. and Wisniewski, M.E., 2001. Induction of Proteins in Response to Biotic and Abiotic Stresses. Dalam: Pessarakli, M. ed. *Handbook of Plant and Crop Physiology*. Marcel Dekker, Inc. New York.
- Ambasta, S.P., 1990. *The Usefull Plants of India*. Publ. & Inform. Dir. Council of Scientific and Industrial Research. New Delhi, India.
- Benzing, D.H., 2008. *Vascular epiphyte*. Cambridge Univ. Press. Cambridge.
- Burkill, I.H., 1935. *A Dictionary of Economic Product of Malay Peninsula*. London.
- Carabelli, M., Possenti, M., Sessa, G., Cioffi, A., Sassi, M., Morelli, G. and Ruberti, I., 2017. Canopy shade causes a rapid and transient arrest in leaf development through auxin-induced cytokinin oxidase activity. *Genes & Development*, 21, pp.1863–1868.
- Fitch, W.H., 1850. *Hoya purpureofusca* Hook.f. Curtis's Botanical Magazine, t. 4486-4553, vol. 76 [ser. 3, vol. 6]: t. 4520
- Gommers, C.M., Visser, E.J., St Onge K.R., Voesenek L.A. and Pierik R., 2013. Shade tolerance: when growing tall is not an option. *Trends in Plant Science*. 18(2), pp.65–71.
- Hidayat, S, Rahayu, S dan Tyas, KN. 2012. Analisa vegetasi tempat tumbuh *Hoya purpureofusca* hook. f. di Resort Selabintana, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. *Berita Biologi* 11(1): 103-110.
- Jacobs, M., Lopez-Garcia M., Phrathep O-P., Lawson T., Oulton R. and Whitney H.M., 2016. Photonic multilayer structure of *Begonia* chloroplasts enhances photosynthetic efficiency. *Nature Plants*, 2 (11), p. 16162. doi:10.1038/nplants.2016.162
- Levitt, J., 1980. Responses of Plant to Environmental Stresses. Vol II. Water, Radiation, Salt and Other Stresses. Academic Press. New York.
- Mohr, H. and Schopfer, P., 1995. *Plant Physiology*. Springer, New York.
- Rahayu, S., 1998. Pertumbuhan dan perkembangan *Hoya diversifolia* Blume yang tumbuh spontan di Kebun Raya Bogor. *Buletin Kebun Raya*, 8, pp. 131–138.
- Rahayu, S., 2012a. *Hoya* (Apocynaceae: Asclepiadoideae) diversity in Gunung Gede Pangrango National Park, West Java, Indonesia. *Reinwardtia*, 13(4), pp. 331–339.
- Rahayu, S., 2012b. Potensi dan konservasi jenis-jenis *Hoya* dataran tinggi Pulau Jawa. *Berkala Penelitian Hayati*. 18, pp. 1–7.
- Rahayu, S. and Abdulhadi, R., 2012. Vertical distribution of *Hoya multiflora*. *Proceeding International Seminar on Biodiversity*. Masyarakat Biodiversitas Indonesia – Universitas Sebelas Maret, Solo, pp. 149–152.
- Rahayu, S., Kusmana, C., Abdulhadi, R., Jusuf, M. and Suharsono. 2010a. Distribution of *Hoya multiflora* Blume at the Gunung Gede Pangrango National Park, Indonesia. *Journal of Forestry Research*, 7(1), pp. 42–52.
- Rahayu, S., Jusuf, M., Suharsono, Abdulhadi, R. and Kusmana, C., 2010b. Morphological variation of *Hoya multiflora* Blume at different habitat type of Bodogol Research Station of Gunung Gede Pangrango National Park, Indonesia. *Biodiversitas*, 11(4), pp. 187–193.
- Ruberti, I., Sessa, G., Cioffi, A., Possenti, M., Carabelli, M. and Morelli, G., 2012. Plant adaptation to dynamically changing environment: The shade avoidance response. *Biotechnology Advances*, 5, pp. 1047–1058.
- Salisbury, F.B. dan Ross, C.W., 1995. *Fisiologi Tumbuhan*. Jilid 2. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Sandmann, G. and Scheer, H., 1998. Chloroplast Pigments. In: Raghavendra, A.S. ed. *Photosynthesis A Comprehensive Treatise*. Cambridge University Press. New York.
- Stout, J.C., Duffy, K.J., Egan, P.A., Harbourn, M. and Hodkinson, T.R., 2015. Genetic diversity and floral width variation in introduced and native populations of a long-lived woody perennial. *AoB PLANTS* 7: plu087; doi:10.1093/aobpla/plu087
- Sunaryo dan Rugayah., 1992. *Flora Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*. Herbarium Bogoriense, Puslitbang Biologi LIPI, Bogor.
- Taiz, L. and Zeiger, E., 2002. *Plant Physiology*. The Benjamin/Cummings Publishing Co. Inc, New York.

Pedoman Penulisan Naskah Berita Biologi

Berita Biologi adalah jurnal yang menerbitkan artikel kemajuan penelitian di bidang biologi dan ilmu-ilmu terkait di Indonesia. Berita Biologi memuat karya tulis ilmiah asli berupa makalah hasil penelitian, komunikasi pendek dan tinjauan kembali yang belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dikirim ke media lain. Masalah yang diliput harus menampilkan aspek atau informasi baru.

Tipe naskah

1. Makalah lengkap hasil penelitian (*original paper*)

Naskah merupakan hasil penelitian sendiri yang mengangkat topik yang *up to date*. Tidak lebih dari 15 halaman termasuk tabel dan gambar. Pencantuman lampiran seperlunya, namun redaksi berhak mengurangi atau meniadakan lampiran.

2. Komunikasi pendek (*short communication*)

Komunikasi pendek merupakan makalah hasil penelitian yang ingin dipublikasikan secara cepat karena hasil temuan yang menarik, spesifik dan atau baru, agar dapat segera diketahui oleh umum. Hasil dan pembahasan dapat digabung.

3. Tinjauan kembali (*review*)

Tinjauan kembali merupakan rangkuman tinjauan ilmiah yang sistematis-kritis secara ringkas namun mendalam terhadap topik penelitian tertentu. Hal yang ditinjau meliputi segala sesuatu yang relevan terhadap topik tinjauan yang memberikan gambaran '*state of the art*', meliputi temuan awal, kemajuan hingga issue terkini, termasuk perdebatan dan kesenjangan yang ada dalam topik yang dibahas. Tinjauan ulang ini harus merangkum minimal 30 artikel.

Struktur naskah

1. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Inggris yang baik dan benar.

2. Judul

Judul diberikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Judul ditulis dalam huruf tegak kecuali untuk nama ilmiah yang menggunakan bahasa latin. Judul harus singkat, jelas dan mencerminkan isi naskah dengan diikuti oleh nama serta alamat surat menyurat penulis dan alamat email. Nama penulis untuk korespondensi diberi tanda amplop cetak atas (*superscript*). Jika penulis lebih dari satu orang bagi pejabat fungsional penelitian, pengembangan agar menentukan status sebagai kontributor utama melalui penandaan simbol dan keterangan sebagai kontributor utama dicatatkan kaki di halaman pertama artikel.

3. Abstrak

Abstrak dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak memuat secara singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil yang signifikan, kesimpulan dan implikasi hasil penelitian. Abstrak berisi maksimum 200 kata, spasi tunggal. Di bawah abstrak dicantumkan kata kunci yang terdiri atas maksimum enam kata, dimana kata pertama adalah yang terpenting. Abstrak dalam Bahasa Inggris merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Editor berhak untuk mengedit abstrak demi alasan kejelasan isi abstrak.

4. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitian. Perlu disebutkan juga studi terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

5. Bahan dan cara kerja

Bahan dan cara kerja berisi informasi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini boleh dibuat sub-judul yang sesuai dengan tahapan penelitian. Metoda harus dipaparkan dengan jelas sesuai dengan standar topik penelitian dan dapat diulang oleh peneliti lain. Apabila metoda yang digunakan adalah metoda yang sudah baku cukup ditulis sitasinya dan apabila ada modifikasi maka harus dituliskan dengan jelas bagian mana dan hal apa yang dimodifikasi.

6. Hasil

Hasil memuat data ataupun informasi utama yang diperoleh berdasarkan metoda yang digunakan. Apabila ingin mengacu pada suatu tabel/grafik/diagram atau gambar, maka hasil yang terdapat pada bagian tersebut dapat diuraikan dengan jelas dengan tidak menggunakan kalimat 'Lihat Tabel 1'. Apabila menggunakan nilai rata-rata maka harus menyertakan pula standar deviasinya.

7. Pembahasan

Pembahasan bukan merupakan pengulangan dari hasil. Pembahasan mengungkap alasan didapatkannya hasil dan arti atau makna dari hasil yang didapat tersebut. Bila memungkinkan, hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan studi terdahulu.

8. Kesimpulan

Kesimpulan berisi informasi yang menyimpulkan hasil penelitian, sesuai dengan tujuan penelitian, implikasi dari hasil penelitian dan penelitian berikutnya yang bisa dilakukan.

9. Ucapan terima kasih

Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada suatu instansi jika penelitian ini didanai atau didukung oleh instansi tersebut, ataupun kepada pihak yang membantu langsung penelitian atau penulisan artikel ini.

10. Daftar pustaka

Tidak diperkenankan untuk mensitasi artikel yang tidak melalui proses *peer review*. Apabila harus menyitir dari "laporan" atau "komunikasi personal" dituliskan '*unpublished*' dan tidak perlu ditampilkan di daftar pustaka. Daftar pustaka harus berisi informasi yang *up to date* yang sebagian besar berasal dari *original papers* dan penulisan terbitan berkala ilmiah (nama jurnal) tidak disingkat.

Format naskah

1. Naskah diketik dengan menggunakan program Microsoft Word, huruf New Times Roman ukuran 12, spasi ganda kecuali Abstrak spasi tunggal. Batas kiri-kanan atas-bawah masing-masing 2,5 cm. Maksimum isi naskah 15 halaman termasuk ilustrasi dan tabel.

2. Penulisan bilangan pecahan dengan koma mengikuti bahasa yang ditulis menggunakan dua angka desimal di belakang koma. Apabila menggunakan Bahasa Indonesia, angka desimal ditulis dengan menggunakan koma (,) dan ditulis dengan menggunakan titik (.) bila menggunakan bahasa Inggris. Contoh: Panjang buku adalah 2,5 cm. Length of the book is 2.5 cm. Penulisan angka 1-9 ditulis dalam kata kecuali bila bilangan satuan ukur, sedangkan angka 10 dan seterusnya ditulis dengan angka. Contoh lima orang siswa, panjang buku 5 cm.

3. Penulisan satuan mengikuti aturan *international system of units*.

4. Nama takson dan kategori taksonomi ditulis dengan merujuk kepada aturan standar yang diakui. Untuk tumbuhan menggunakan *International Code of Botanical Nomenclature* (ICBN), untuk hewan menggunakan *International Code of Zoological Nomenclature* (ICZN), untuk jamur *International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plant* (ICFAFP), *International Code of Nomenclature of Bacteria* (ICNB), dan untuk organisme yang lain merujuk pada kesepakatan Internasional. Penulisan nama takson lengkap dengan nama author hanya dilakukan pada bagian deskripsi takson, misalnya pada naskah taksonomi. Penulisan nama takson untuk bidang lainnya tidak perlu menggunakan nama author.

5. Tata nama di bidang genetika dan kimia merujuk kepada aturan baku terbaru yang berlaku.

6. Untuk range angka menggunakan en dash (–), contohnya pp.1565–1569, jumlah anakan berkisar 7–8 ekor. Untuk penggabungan kata menggunakan hyphen (-), contohnya: masing-masing.

7. Ilustrasi dapat berupa foto (hitam putih atau berwarna) atau gambar tangan (*line drawing*).

8. Tabel

Tabel diberi judul yang singkat dan jelas, spasi tunggal dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga Tabel dapat berdiri sendiri. Tabel diberi nomor urut sesuai dengan keterangan dalam teks. Keterangan Tabel diletakkan di bawah Tabel. Tabel tidak dibuat tertutup dengan garis vertikal, hanya menggunakan garis horisontal yang memisahkan judul dan batas bawah.

8. **Gambar**
Gambar bisa berupa foto, grafik, diagram dan peta. Judul gambar ditulis secara singkat dan jelas, spasi tunggal. Keterangan yang menyertai gambar harus dapat berdiri sendiri, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Gambar dikirim dalam bentuk .jpeg dengan resolusi minimal 300 dpi, untuk *line drawing* minimal 600dpi.
9. **Daftar Pustaka**
Sitasi dalam naskah adalah nama penulis dan tahun. Bila penulis lebih dari satu menggunakan kata 'dan' atau *et al.* Contoh: (Kramer, 1983), (Hamzah dan Yusuf, 1995), (Premachandra *et al.*, 1992). Bila naskah ditulis dalam bahasa Inggris yang menggunakan sitasi 2 orang penulis maka digunakan kata 'and'. Contoh: (Hamzah and Yusuf, 1995). Jika sitasi beruntun maka dimulai dari tahun yang paling tua, jika tahun sama maka dari nama penulis sesuai urutan abjad. Contoh: (Anderson, 2000; Agusta *et al.*, 2005; Danar, 2005). Penulisan daftar pustaka, sebagai berikut:
 - a. **Jurnal**
Nama jurnal ditulis lengkap.
Agusta, A., Maehara, S., Ohashi, K., Simanjuntak, P. and Shibuya, H., 2005. Stereoselective oxidation at C-4 of flavans by the endophytic fungus *Diaporthe* sp. isolated from a tea plant. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin*, 53(12), pp.1565–1569.
 - b. **Buku**
Anderson, R.C. 2000. *Nematode Parasites of Vertebrates, Their Development and Transmission*. 2nd ed. CABI Publishing. New York. pp. 650.
 - c. **Prosiding atau hasil Simposium/Seminar/Lokakarya.**
Kurata, H., El-Samad, H., Yi, T.M., Khammash, M. and Doyle, J., 2001. Feedback Regulation of the Heat Shock Response in *Eschericia coli*. *Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control*. Orlando, USA. pp. 837–842.
 - d. **Makalah sebagai bagian dari buku**
Sausan, D., 2014. Keanekaragaman Jamur di Hutan Kabungolor, Tau Lumbis Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam: Irham, M. & Dewi, K. eds. *Keanekaragaman Hayati di Beranda Negeri*. pp. 47–58. PT. Eaststar Adhi Citra. Jakarta.
 - e. **Thesis, skripsi dan disertasi**
Sundari, S., 2012. Soil Respiration and Dissolved Organic Carbon Efflux in Tropical Peatlands. *Dissertation*. Graduate School of Agriculture. Hokkaido University. Sapporo. Japan.
 - f. **Artikel online.**
Artikel yang diunduh secara online ditulis dengan mengikuti format yang berlaku untuk jurnal, buku ataupun thesis dengan dilengkapi alamat situs dan waktu mengunduh. Tidak diperkenankan untuk mensitasi artikel yang tidak melalui proses peer review misalnya laporan perjalanan maupun artikel dari laman web yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya seperti wikipedia.
Himman, L.M., 2002. A Moral Change: Business Ethics After Enron. San Diego University Publication. <http://ethics.sandiego.edu/LMH/oped/Enron/index.asp>. (accessed 27 Januari 2008) bila naskah ditulis dalam bahasa inggris atau (diakses 27 Januari 2008) bila naskah ditulis dalam bahasa indonesia

Formulir persetujuan hak alih terbit dan keaslian naskah

Setiap penulis yang mengajukan naskahnya ke redaksi Berita Biologi akan diminta untuk menandatangani lembar persetujuan yang berisi hak alih terbit naskah termasuk hak untuk memperbanyak artikel dalam berbagai bentuk kepada penerbit Berita Biologi. Sedangkan penulis tetap berhak untuk menyebarkan edisi cetak dan elektronik untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Formulir itu juga berisi pernyataan keaslian naskah yang menyebutkan bahwa naskah adalah hasil penelitian asli, belum pernah dan tidak sedang diterbitkan di tempat lain serta bebas dari konflik kepentingan.

Penelitian yang melibatkan hewan

Setiap naskah yang penelitiannya melibatkan hewan (terutama mamalia) sebagai obyek percobaan/penelitian, wajib menyertakan '*ethical clearance approval*' terkait animal *welfare* yang dikeluarkan oleh badan atau pihak berwenang.

Lembar ilustrasi sampul

Gambar ilustrasi yang terdapat di sampul jurnal Berita Biologi berasal dari salah satu naskah yang dipublikasi pada edisi tersebut. Oleh karena itu, setiap naskah yang ada ilustrasinya diharapkan dapat mengirimkan ilustrasi atau foto dengan kualitas gambar yang baik dengan disertai keterangan singkat ilustrasi atau foto dan nama pembuat ilustrasi atau pembuat foto.

Proofs

Naskah *proofs* akan dikirim ke penulis dan penulis diwajibkan untuk membaca dan memeriksa kembali isi naskah dengan teliti. Naskah proofs harus dikirim kembali ke redaksi dalam waktu tiga hari kerja.

Naskah cetak

Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan akan diberikan 1 eksemplar majalah Berita Biologi dan *reprint*. Majalah tersebut akan dikirimkan kepada *corresponding author*

Pengiriman naskah

Naskah dikirim secara online ke website berita biologi: http://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/berita_biologi

Alamat kontak

Redaksi Jurnal Berita Biologi, Pusat Penelitian Biologi-LIPI
Cibinong Science Centre, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong 16911
Telp: +61-21-8765067, Fax: +62-21-87907612, 8765063, 8765066,
Email: berita.biologi@mail.lipi.go.id
jurnalberitabiologi@yahoo.co.id atau
jurnalberitabiologi@gmail.com

BERITA BIOLOGI

Vol. 18(2)

Isi (Content)

Agustus 2019

P-ISSN 0126-1754

E-ISSN 2337-8751

TINJAUAN ULANG (REVIEW)

PERKEMBANGAN SEL MAMALIA *CHINESE HAMSTER OVARY* (CHO) DALAM PRODUKSI OBAT BERBASIS PROTEIN [Development of Mammalian Cell Chinese Hamster Ovary (CHO) in the Production of Protein Based Drugs]

Adi Santoso 125 – 133

MAKALAH HASIL RISET (ORIGINAL PAPERS)

BUDIDAYA UDANG GALAH (*Macrobrachium rosenbergii* (de Man, 1879)) SISTEM AKUAPONIK BERBASIS POLIKULTUR DENGAN IKAN TAMBAKAN (*Helostoma temminckii* Cuvier, 1829) [The Polyculture Based Aquaponic System of Freshwater Prawn (*Macrobrachium rosenbergii* (de Man, 1879)) and Kissing Gouramy (*Helostoma temminckii* Cuvier, 1829)]

Lies Setijaningsih, Bambang Gunadi dan Eddy Supriyono 135 – 144

KERAGAMAN KERAPATAN KAYU BATANG DAN CABANG KOMUNITAS POHON DI HUTAN GUNUNG PAPANDAYAN, JAWA BARAT [Diversity of Tree Stem and Branch Wood Density in Forest of Mount Papandayan, West Java]

Eka Fatmawati Tihurua dan Endah Sulistyawati 145 – 154

PREFERENSI PERTUMBUHAN BIBIT GEMBILI [*Dioscorea esculenta* (Lour.) Burkill ASAL BAHAN TANAM DAN TEKNIK PENANAMAN YANG BERBEDA [Growth Preference on Different Seed Material and Planting Technique on Lesser Yam (*Dioscorea esculenta* (Lour.) Burkill)] Propagation]

Ning Wikan Utami, Peni Lestari dan Albert Husein Wawo 155 – 163

SKRINING AWAL AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN ANTIOKSIDAN EKSTRAK SEMUT (INSECTA: FORMICIDAE) DARI GARUT- JAWA BARAT [A Preliminary Screening of Antibacterial and Anti-oxidant Activities of Ant (Insecta: Formicidae) Extracts Collected from Garut – West Java]

Oscar Efendy, Ahmad Fathoni, Praptiwi, Mohammad Fathi Royyani, Dewi Wulansari dan Andria Agusta 165 – 173

TIPE STOMATA TIGA PULUH DUA JENIS BEGONIA ALAM INDONESIA KOLEKSI KEBUN RAYA CIBODAS [The Stomata Type of Thirty Two Indonesian Native Begonia of Cibodas Botanical Garden Collection]

Muhammad Efendi 175 – 183

PERSPEKTIF GENDER SUKU OSING DI BANYUWANGI DALAM PENILAIAN KEMANFAATAN TANAMAN [Gender Perspective of Osing Tribe in Banyuwangi in Assessment of Plant Benefits]

Budi Prasetyo, Tatik Chikmawati, Eko Baroto Walujo dan Ervial A.M. Zuhud 185 – 197

NISHAH KELAMIN, HUBUNGAN PANJANG-BERAT DAN UKURAN REPRODUKSI HIU *Hexanchus* spp. DI PERAIRAN SELATAN NUSA TENGGARA [Sex Ratio, Length-Weight Relationship and Reproductive Size of Sixgill Shark, *Hexanchus* spp. from Southern Nusa Tenggara Waters]

Agus Arifin Sentosa 199 – 208

PENGARUH PADAT TEBAR LARVA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN SINTASAN PADA IKAN UCENG (*Nemacheilus fasciatus*, Valenciennes 1846) [Effects of Larval Stocking Density on Growth and Survival of Barred Loach (*Nemacheilus fasciatus*, Valenciennes 1846)]

Jojo Subagja, Vitas Atmadi Prakoso, Otong Zenal Arifin dan Anang Hari Kristanto 209 – 114

KERAGAMAN MORFOLOGI *Hoya purpureofusca* Hook.f. ASAL TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO [Morphological Variation of *Hoya purpureofusca* Hook.f. from Gunung Gede Pangrango National Park]

Sri Rahayu, Kartika Ning Tyas dan Hary Wawangningrum 215 – 223

PERBANDINGAN KARAKTERISASI BIOMETRIK IKAN LELE DUMBO DENGAN IKAN LELE AFRIKA (*Clarias gariepinus* BURCHELL, 1822) [Biometric Characterization of Lele Dumbo Compared to that of African Catfish (*Clarias gariepinus* Burchell, 1822)]

Bambang Iswanto, Imron, Rommy Suprpto dan Huria Marnis 225 – 234

ANCAMAN JENIS IKAN ASING LOUHAN TERHADAP IKAN ENDEMIK DI DANAU MATANO, SULAWESI SELATAN [Threat of Alien Species Louhan to Endemic Fish in Lake Matano, South Sulawesi]

Syahroma Husni Nasution, Gadis Sri Haryani, Rahmi Dina dan Octavianto Samir 235 – 245

KOMUNIKASI PENDEK (SHORT COMMUNICATION)

ISOLASI GEN SITRAT SINTASE BAKTERI *Pseudomonas aeruginosa* PS2 DARI RIZOSFER POHON KRUIING (*Dipterocarpus* sp.) UNTUK MODEL KONSTRUKSI METABOLISME SEL MIKROALGA BERKARBOHIDRAT RENDAH [Isolation of Citrate Synthase Gene of *Pseudomonas aeruginosa* PS2 Bacterium from Kruiing Tree (*Dipterocarpus* sp.) Rhizosphere for Construction Model of Low Carbohydrate Algal Cell Metabolism]

Dwi Susilaningsih, Asahedi Umoro, Fredrick Onyango Ochieng, Dian Noverita Widyaningrum, Hani Susanti, Hadi Susilo, I Nengah Swastika dan Utut Widyastuti 247 – 253