

## FAUNA BURUANA.

### COLEOPTERA, Subfam. Melolonthinae.

Von

I. MOSER,

Ellrich.

#### *Antoserica buruana* MOS.

Deutsche Ent. Zeitsch. 1916, p. 132. Stat. 1.: VIII.—X. 21. 1. Ex.  
Im Museum N. A. M.

#### *Apogonia buruensis* MOS.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 418. Stat. 18.: 20—21. X. 21. 1 Ex.  
Im Museum N. A. M.

#### *Apogonia toxopei* nov. spec.

*A. setiferae* MOS. similis et affinis, supra densius punctata, tarsi antici paulo fortius dilatati. Fusco-aenea, nitida, albido-setosa. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo margine antico leviter sinuato, angulis rotundatis; prothorace fere duplo latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, angulis anticis fere rectangulis, dorso crebre setifero-punctato; scutello, lateribus laevibus exceptis, punctato; elytris leviter rugoso-punctatis, punctis setis instructis. Subtus sat crebre setifero-punctata, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis bidentatis, tarsis anticis in mare dilatatis. Long. 8—9 mm.

Stat. 1: 10.—16., III. 21. 4 Ex.; VIII. 21. 1 Ex.; 2.—6. XII. 21. 1 Ex.; I. 22. 1 Ex.; Stat. 5. V.—VI. 21. 1 Ex.; Stat. 8. II. 22. 1 Ex.; Stat. 15. 2.—3. X. 21. 1 Ex.

3 Ex. in meiner Sammlung; 7 im Museum N. A. M.

Die Art ist der gleichfalls von Buru beschriebenen *A. setifera* MOS. sehr ähnlich, doch ist die Oberseite bedeutend dichter punktiert, die vorderen Tarsenglieder sind ein wenig stärker erweitert.

#### *Apogonia cavifrons* nov. spec.

♂. Praecedenti similis. Rufo-fusca, nitida, griseo-setosa. Capite dense punctato, punctis setosis, fronte post clypei suturam impressa, clypeo antrorsum angustato, margine antico reflexo, leviter sinuato, angulis rotundatis; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis posticis rotundatis, angulis anticis acutis, productis, dorso crebre punctato, punctis setosis;

scutello in parte media punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis setis instructis, costis angustis, sublaevibus; pygidio fortiter punctato, punctis erecte setosis. Subtus ubique setifero-punctata, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis dilatatis. Long. 8 mm.

Stat. 6.: 29. III. — 10. IV. 21. 1 Ex. In meiner Sammlung.

Diese Art ist der vorhergehend beschriebenen Art sehr ähnlich, doch unterscheidet sie sich durch die hinter der Clypeusnaht breit eingedrückte Stirn und durch die dreizähligen Vorderschienen. Das einzige vorliegende Exemplar ist rotbraun gefärbt.

### **Apogonia tuberculifrons nov. spec.**

♂. Praecedenti similis et affinis. Fusca, nitida, griseo setosa. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, fronte post clypei suturam bituberculata, clypeo antrorsum angustato, margine antico reflexo, sinuato, angulis rotundatis; prothorace longitudine duplo latiore, lateribus curvatis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, angulis anticis acutis, productis, dorso subrugoso-punctato, punctis setis instructis, macula media longitudinalis, plus minusve distincta; laevi; scutello, lateribus exceptis, setifero-punctato; elytris subrugosis, dense punctatis, punctis setis adpressis vestitis, costis angustis, sublaevibus; pygidio grosse punctato, punctis setosis. Subtus crebre setifero-punctata, abdominis lateribus haud carinatis; tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis maris dilatatis. Long. 9 mm.

Stat. 7.: VIII. 21. 3 Ex. In meiner Sammlung 2 Ex.; 1 im Museum N. A. M.

Die Art hat ebenso wie die vorhergehend beschriebene Art dreizählige Vorderschienen, die Stirn ist jedoch hinter der Clypeusnaht nicht eingedrückt, sondern mit zwei Höckern versehen. Der Halsschild zeigt eine mehr oder weniger deutliche glatte mittlere Längsschwiele.

### **Apogonia spec.?**

Zwei einzelne Exemplare von wahrscheinlich neuen Arten liegen vor, von deren Beschreibung ich jedoch Abstand nehme, da es sich um weibliche Stücke handelt. Wie es scheint, ist das eine Exemplar behaart gewesen, die Behaarung aber abgerieben.